

Patienter eller personale med MRSA

Forebyggelse af spredning af MRSA på tandklinikken opnås ved konsekvent efterlevelse af de **generelle infektionshygiejniske retningslinjer** ved alle undersøgelser og behandlinger. Der skal således ikke anvendes supplerende infektionshygiejniske foranstaltninger på Tandlægeskolens klinikker for hverken patienter eller personale med MRSA.

Med 3. udgave af "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA" 2016 har Sundhedsstyrelsen ændret deres retningslinjer for håndtering af både patienter og personale med MRSA:

- Der skal ikke længere anvendes supplerende retningslinjer ved undersøgelse og behandling af **MRSA-positive patienter** (fx overtrækskittel og både rengøring og overfladedesinfektion efter behandling).
- **Studerende og personale**, der har arbejdet klinisk i udlandet, skal ikke længere testes for MRSA ved hjemkomst, ligesom personale ikke længere har pligt til at oplyse om evt. MRSA-bærertilstand.

Baggrunden herfor er, at Sundhedsstyrelsen med de sidste 10 års erfaringer mht. smittespredning og risiko for stigmatisering ønsker at begrænse anvendelsen af supplerende foranstaltninger til steder, hvor syge og svækkede med størst risiko for alvorlig sygdom med MRSA opholder sig (hospitaller, plejehjem/hjemmepleje).

Kun ved større kirurgiske tandbehandlinger, der foretages på hospitaler eller i specialtandlægepraksis for tand-, mund- og kæbekirurgi, samt i omsorgstandplejen gælder supplerende retningslinjer.