



Uheldshåndtering

Stik- eller skæreheld:

Hvis du stikker/skærer dig på et instrument, der har været i kontakt med patienter/patientmateriale, **skal** du sørge for:

1. at **skylle/afvaske området** med vand og sæbe
2. at **påføre området ethanol (70-85%) 2 gange**
3. at **ringe 1813 for at blive henvist til Akutmodtagelse** (skadestue) for opfølgning på mulig eksposition for hepatitis B og C samt HIV. Her foretages følgende:
 - risikovurdering af uheldet
 - der tages blodprøve til test for hepatitis B antigen og antistof samt hepatitis C antistof
 - vaccination mod hepatitis B (bør startes snarest efter uheldet og senest efter 48 timer)
 - ved sikker eller stærkt begrundet mistanke om udsættelse for HIV-smitte kontaktes infektionsmedicinsk afdeling mhp. vurdering af evt. antiviral behandling (PEP)
4. at udfylde en **registreringsblanket** til stikskader med beskrivelse af hændelsesforløbet (herunder om patienten har en kendt smitsom sygdom, fx HIV eller hepatitis B) mv.

Registreringsblanketterne findes i rum 31.1.26 og 31.2.24. Blanketten underskrives af områdeleder, der fremsender kopi til den daglige arbejdsmiljøleder, og du modtager selv en kopi. Denne registrering er dokumentation for, at hændelsen har fundet sted og vil kunne anvendes ved krav om arbejdsskadeerstatning, såfremt uheldet medfører infektion og sygdom. Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen skal kun ske ved fravær over en dag.

Stænk eller sprøjt i øjne:

- Ved stænk i øjnene skal der straks skylles med rigelig øjenskyllévæske eller vand, gerne isotonisk saltvand (0,9%)
- Ved stænk med blod skal du ringe 1813 for henvisning til Akutmodtagelse (som under stik- eller skæreheld, punkt 3 + 4)
- Efter uheld med syre- eller basestænk skal der skylles i mindst 15 minutter. Se endvidere sikkerhedsdatablad for det specifikke stof